



Näin laitat Lecrolyn-silmätipat

Tutustu huolella alla oleviin Lecrolyn-silmätippojen käyttöohjeisiin.

Pakkaukset

Lecrolyn: Pullo, 5 ml ja kerta-annospipetit 20 x 0,2 ml ja 60 x 0,2 ml. Apteekista.

Lecrolyn SINE: Säilytysaineeton pullo: 5 ml.

Tiputtaminen


Ennen tiputtamista:

- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Ethän heitä lääkkeitä viemäriin tai hävitä talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin suojelet luontoa.

Oireiden pitkittyessä käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkauksessa olevaan pakkausselosteeseen.

**Lecrolyn-kerta-annospipetit:**

Kerta-annospipetin käyttöohje on painettu koteloon. Yksi pipetti riittää molempiin silmiin.

Käytä jokaisella käyttökerralla uutta kerta-annospipettiä. Hävitä käytetty pipetti ja mahdollisesti jäljelle jäänyt sisältö.

1. Avaa pussi merkkiviivaa pitkin.
2. Irrota pipettiliuskasta 1 pipetti.
3. Sulje pussi huolellisesti taittamalla reuna.
4. Varmista että liuos on pipetin alaosassa ja kierrä pipetti auki.
5. Tiputa 1-2 tippaa silmään/silmiin.

**Lecrolyn-silmätippapullo:**

- 1.** Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.
- 2.** Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.
- 3.** Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.
- 4.** Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo huolellisesti.

**Lecrolyn Sine -silmatippapullo:**

1. Pidä pulloa juuri **korkin alapuolelta** ja avaa pullo kiertämällä korkkia. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.



3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään. Tipan ulostulo voi kestää muutaman sekunnin. Älä puserra liian kovaa.

4. Räpytä silmää muutaman kerran, jotta tippa leviää koko silmään.

5. Ravista pulloa kerran alaspäin niin, että **jäljellä oleva neste häviää kärjestä**. Tiputa Lecrolyn Sineä myös toiseen silmään toistamalla vaiheet 2–4.



6. Ennen kuin laitat korkin takaisin paikalleen, ravista pulloa kerran alaspäin niin, että **kärki jää kuivaksi**.

Huom! Pulloon voi jäädä pieni määrä liuosta käytön loppuksi. Kaikki pullot on täytetty niin täyteen, että niissä on varmasti tarpeeksi liuosta.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.